



CREADORES DE LA LEY DE AMNISTÍA MÉDICA DEL 911 DE GEORGIA Y ACCESO AMPLIADO A LA NALOXONA

GEORGIAOVERDOSEPREVENTION.ORG

¿Qué es la naloxona o Narcan?

La naloxona es un medicamento de venta libre que salva vidas y que revierte la depresión respiratoria durante una sobredosis de opioides.

Es segura a cualquier temperatura.

Tiene una validez de 28 años después del vencimiento impreso.

En Georgia, es legal administrar naloxona a cualquier persona que no responda y se sospeche que puede estar sufriendo una sobredosis.

La naloxona sólo actúa sobre los opioides como la heroína, la oxicodona, el fentanilo, etc.

No tiene ningún efecto en una persona que no ha tomado opioides.


No se puede dar una sobredosis de naloxona a una persona dándole demasiada cantidad.

La naloxona dura sólo entre 30 y 90 minutos, por lo que una persona puede volver a sufrir una sobredosis. Por eso es de vital importancia llamar al 911 en busca de ayuda y permanecer con la persona hasta que llegue la ayuda médica.

SI ERES TESTIGO DE
UNA SOBREDOSIS,
LA LEY DE GEORGIA TE PROTEGE

No escapes - ¡llama al 911!

GeorgiaOverdosePrevention.org



La ley de Georgia protege tanto a la persona que llama como a la víctima del arresto, cargos o enjuiciamiento durante una sospecha de sobredosis si se llama al 911. Proporciona inmunidad contra cargos por cantidades de drogas y parafernalia de drogas para "uso personal", incluso si alguien tiene una orden de protección o de restricción, condiciones de libertad previa al juicio o está en libertad condicional.

La persona que llama y la víctima deben permanecer en el lugar hasta que llegue la asistencia médica para que se aplique la inmunidad.

Nuestra ley no proporciona inmunidad para órdenes judiciales pendientes ni aborda el estatus migratorio.

REPORTA UNA REVERSIÓN 404-919-4812

CÓMO TRATAR UNA SOBREDOSIS

Signos comunes de una sobredosis

- ▶ **Inconsciencia**
- ▶ **Labios o uñas azules**
- ▶ **Pupilas contraídas**
- ▶ **No respira, ronca o hace gárgaras**

Vídeos de capacitación:



El cerebro necesita oxígeno. La respiración boca a boca es uno de los tratamientos más eficaces durante una sobredosis.

Tratamiento de cualquier sobredosis

- 1) Verifica si la persona está consciente
- 2) Acuéstala boca arriba sobre una superficie dura.
- 3) Inclina la cabeza de la persona hacia atrás para abrir las vías respiratorias.
- 4) Retira cualquier objeto extraño que pueda tener en la boca.
- 5) Adminístrale la naloxona.
- 6) Llama al 911. Di que estás con una persona que **ESTÁ INCONSCIENTE**.
- 7) Sigue las instrucciones del operador del 911.
- 8) Administra respiraciones de rescate inclinando la cabeza de la persona hacia atrás y abriendo las vías respiratorias. Realiza una respiración cada 5-6 segundos.
- 9) Si la persona no empieza a respirar, puedes administrar dosis adicionales de naloxona cada 2-3 minutos hasta que empiece a respirar o hasta que llegue el SEM.
- 10) Si la víctima comienza a respirar, colócala de costado (posición de recuperación)
- 11) Si rechaza el transporte de SEM, por favor, quédate con la persona durante 6 a 8 horas en caso de que vuelva a sufrir una sobredosis.

Naloxona inyectable: Requiere ensamblado. Sigue las instrucciones a continuación.

1 Quita la tapa del vial de naloxona y descubre la aguja.



2 Invierte el vial, inserta la aguja y tira del émbolo para sacar 1 ml de naloxona en la jeringa. Asegúrate de que la aguja permanezca dentro de la naloxona.



3 Inyecta 1 ml de naloxona en el músculo del brazo superior o del muslo.



Se puede administrar la inyección a través de la ropa

4 Debes administrar una inyección de naloxona cada 2 minutos hasta que la persona responda o llegue el servicio médico de emergencia (SEM).



¡La naloxona nasal o Narcan no requiere receta!

Para administrar naloxona nasal:

- **Abre el paquete blíster**
- **Inclina la cabeza de la persona hacia atrás**
- **Coloca la unidad completamente en la fosa nasal**
- **Presiona el émbolo**
- **Mantén su cabeza inclinada hacia atrás por unos segundos**
- **Repite el proceso alternando las fosas nasales cada 2-3 minutos hasta que la respiración vuelva**

¿Cómo afecta la xilacina una sobredosis?

La xilacina es un sedante que se encuentra cada vez más frecuentemente en el suministro de fentanilo. Puede provocar una sedación prolongada, pudiendo quedar alguien inconsciente durante horas. En una situación de sobredosis, 1 o 2 dosis de naloxona revertirán la sobredosis de fentanilo, pero si también hay xilacina presente, la respiración puede regresar, pero la persona aún puede estar sedada. Una vez que respira, ¡no necesita más naloxona! Continúa realizando respiraciones de rescate, de ser necesario. Una vez que recupere la respiración, quédate con la persona y mantén las vías respiratorias abiertas hasta que se despierte.